

Methylalkohol, nebo ethylalkohol? Kdo to bezpečně pozná? Zkouška hořením určitě ne!



12. 09. 2012 14:59

Celkem již zemřelo 13 lidí (stav dnes v 15 hod.), kteří se otrávil metylalkoholem. V nemocnicích v osmi městech jsou přes dvě desítky otrávených pacientů, mnozí jsou v kritickém stavu.

"Methylalkohol a ethylalkohol nejdou od sebe bezpečně poznat. Zkouškou hoření, tak jak to mylně uváděla některá média, to rozhodně nejde. Nejlepší je se přímo obrátit na specializovaná pracoviště, která dokážou nezávadnost jakéhokoliv alkoholu otestovat," řekla Mgr. Jitka Macháčková, vedoucí Oddělení klinické a soudní toxikologie KNL.

V Libereckém kraji stačí navštívit Oddělení klinické a soudní toxikologie Krajské nemocnice Liberec, které je schopno spolehlivě prokázat přítomnost metylalkoholu v krvi, moči nebo v dodaných tekutinách (podezřelém nápoji).

"K průkazu a stanovení methylalkoholu v podezřelém nápoji postačí malé množství původní tekutiny. Optimální množství je 10 ml v uzavřené lahvičce," dodala Macháčková.

Cena vyšetření včetně 14%DPH:

Průkaz (přítomnost: pozitivní - negativní) metylalkoholu v jednom vzorku 558Kč

Průkaz a stanovení (koncentrace - kolik) metylalkoholu v jednom vzorku 1116Kč

Pracovní doba oddělení: Po-Pá

Příjem materiálu 8,00-14,00 hod.

Kontakt naleznete zde: http://www.nemlib.cz/web/index.php?menu=1_33_32